


## Помощь в отправлении естественных потребностей

### Судно

#### Мужское судно для мочеиспускания



#### Обычное судно

- легкое;
- в форме лопаточки;
- из пластика;
- с узким краем и крышкой.

#### Перед подачей судна:

- 1 Положите больного ровно.



- 2 Попросите по возможности согнуть ноги в коленях и приподнять таз.

**i** При необходимости больной может опереться о поручни кровати.

- !**
- Не торопите, но и не оставляйте человека надолго на судне (это небезопасно).
  - По возможности выйдите из комнаты, пока больной опорожняется, дайте ему колокольчик или радионяню, чтобы он мог вас позвать.

**!** Поступайте с больным человеком так, как хотите, чтобы поступали с вами.

Научные консультанты:  
О.Н. Выговская, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»;  
А.Н. Ибрагимов, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ», ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

### Кресло-туалет



- Ставьте с той стороны кровати, на которую больному удобно поворачиваться.
- Опускайте/убирайте подлокотники со стороны кровати.

#### Учитывайте вес больного



### Подгузник



- Если человек может сказать, что хочет в туалет, никогда не надевайте на него подгузник. Используйте судно или кресло-туалет до тех пор, пока это возможно. Использование подгузника может быть удобно вам, но для больного это унижение.
- Меняйте подгузники и пеленки сразу. Грязные подгузники причиняют сильный физический и эмоциональный дискомфорт, приводят к пролежням и инфекциям.
- Подгузник должен быть по размеру. Не используйте подгузник большего размера, рассчитывая на то, что он больше впитывает.
- Не используйте одновременно катетер, подгузник и пеленку. Это неудобно для больного и вызывает опрелости.
- После смены подгузника проветривайте помещение.

# Интимная гигиена

Если вы ухаживаете за малоподвижным тяжелобольным человеком, не пренебрегайте его интимной гигиеной.



#### Можно и нужно



Создать для больного возможность позвать вас с помощью колокольчика или электронного звонка. Он может стесняться сказать, что ему нужно в туалет.



Быть максимально деликатными. Помните, что ваш близкий испытывает неловкость от своей беспомощности.



Договориться о специальных фразах, сигналах, которыми больной при посторонних людях сможет сообщить вам, что хочет в туалет.



Обсуждать интимные вопросы только наедине с больным и с его позволения.

Неправильная гигиена может вызвать:

- дискомфорт больного;
- опрелости, зуд;
- геморрой;
- неприятный запах;
- инфекции мочеполовой системы;
- пролежни;
- повреждения и кровотечения из уретры и мочевого пузыря;
- депрессию.

#### Нельзя



Ругать человека за то, что он испражнился.



Делать интимные вопросы предметом семейного обсуждения.



Позволять себе шутливые и неловкие комментарии. Нередко больные начинают есть и пить, чтобы не ходить в туалет и избежать неловкости.



фонд помощи  
хосписам

**Вера**



Мастерская  
заботы

Горячая линия помощи  
неизлечимо больным людям


Веб-сайты

8 (800) 700-84-36  
[www.fond-vera.ru](http://www.fond-vera.ru)  
[www.pro-palliativ.ru](http://www.pro-palliativ.ru)

# Интимная гигиена лежачего больного

Ухаживайте за интимными местами деликатно, чтобы ваш близкий испытывал минимум дискомфорта. Интимную гигиену лучше проводить тому, кого сам больной выбрал для этого.

## Создайте комфортные условия



- Обеспечьте **удединенность**: закройте дверь или установите ширму. Если комната расположена на первом этаже, закрывайте шторы и окна.
- Поддерживайте **оптимальную температуру** в комнате и избегайте сквозняков.
- Порошряйте **максимальную самостоятельность** – пусть будут действия, которые больной выполняет сам или с вашей помощью.

## Проводите процедуру:

- утром;
- вечером;
- после каждого испражнения;
- при смене подгузника.

### Вам понадобятся:

- перчатки;
- тазик с теплой водой (+36-37 °C);
- губка;
- моющее средство для интимной гигиены;
- пеленка;
- подгузник (при необходимости);
- мягкое полотенце.



- Спрашивайте согласие больного прежде, чем что-то сделать.
- Всегда предупреждайте больного обо всех своих действиях и комментируйте их, так как человек не видит, что вы делаете, и может нервничать.

## Можно и нужно

Использовать специальную пенку для интимной гигиены или гигиенические салфетки.  
 Важно чередовать их применение с подмыванием водой, иначе кожа не будет дышать.

Менять полотенце **каждый день**.  
 Если у больного кандидоз, трихомоноз, то надо пользоваться одноразовыми полотенцами.

Выбирать нижнее белье из натуральных тканей, без грубых швов, с мягкой резинкой.

Если вы заметили на коже сыпь, покраснение, раздражение, гнойнички, обратитесь к врачу – это может быть началом пролежневого процесса!

## Нельзя использовать

**Моющие средства на основе масла** – они не пропускают воздух и не дают коже дышать.

**Тальк** – он образует комки, требует тщательного вымывания, а также может содержать примеси асбеста, признанного опасным для здоровья.

**Обычное мыло или гель для душа** – они разрушают микрофлору.

**Раствор марганцовки или фурацилина** – они сушат кожу.

## Процесс

### 1 Начальное положение



### 11 Переворот на бок



### 16 Конец процедуры



1 Уложите больного на спину.

2 Постелите непромокаемую пеленку под ягодицы больного.

3 Попросите согнуть ноги в коленях и раздвинуть их или аккуратно сделайте это сами.

4 Наденьте перчатки.

5 Снимите повязки, если у больного есть раны в области паха.

6 Прикройте низ живота и бедра большим легким полотенцем, чтобы больной не был перед вами обнажен.

7 Намочите губку водой и протрите интимные места.

8 Нанесите моющее средство для интимной гигиены.

9 Помойте паховые складки и приступите к **процедуре ухода за половыми органами**:

10 Мягко промокните область промежности полотенцем.

11 Поверните больного на бок, чтобы облегчить доступ к анальному отверстию и промежности.

12 Помойте ягодицы, ягодичную складку, задний проход по направлению от **половых органов**. Промывайте губку в чистой воде до тех пор, пока не избавитесь от остатков каловых масс.

13 Вытрите насухо все кожные складки (высокий риск возникновения опрелостей).

14 Нанесите защитный крем (особенно если у больного подгузник).

15 Уберите пеленку.

16 Поверните человека обратно на спину.

17 Сделайте перевязку ран (при необходимости).

18 Наденьте подгузник (при необходимости).

19 Накройте человека одеялом.

## Женщины

1 Аккуратно раздвиньте половые губы.

2 Промойте промежность губкой в направлении от половенных органов к заднему проходу (вниз и назад).

3 Повторите несколько раз до полного смывания моющего средства.

В подмывании нуждаются только места снаружи. Внутренняя часть влагалища очищается самостоятельно.

- Нельзя проникать пальцами внутрь влагалища!
- Не допускайте попадания моющего средства во влагалище!

## Мужчины

1 Аккуратно отодвиньте крайнюю плоть.

2 Помойте головку полового члена.

3 Закройте головку полового члена крайней плотью.

4 Помойте яички и паховую зону в направлении спереди назад.

- Не тяните, не сдавливайте половенной член во время проведения гигиенических процедур.
- Не допускайте попадания моющего средства в устье мочеиспускательного канала, чтобы избежать раздражения.

Мойте **только в одном направлении**: от половенных органов к анальному отверстию – то есть вниз и назад. Такой способ защищает от переноса бактерий и заболеваний мочеполовой системы.